

Recomendaciones generales

Elección de la Vacuna

- *Realizar un Diagnóstico de Situación junto al Veterinario para determinar contra qué enfermedades vacunar y el momento óptimo para hacerlo.
- *Identificar categorías a vacunar.
- *Llevar registro de Vacunaciones: nombre de vacuna, marca, fecha de vencimiento, serie, categorías vacunadas y fecha de aplicación.

Almacenamiento


- *Almacenar las vacunas de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta
- *Respetar siempre la cadena de frío. Conservar entre 4° y 8°C.
- *Evitar el congelamiento.
- *Evitar la exposición directa a la luz solar.
- *No reutilizar frascos abiertos con anterioridad.

Manejo del Instrumental

- *Uso del instrumental por personal capacitado, preferentemente por un profesional veterinario o bajo su supervisión directa.
- *Usar jeringas limpias, desinfectadas y en buen estado junto a agujas con buen filo y reemplazarlas en la medida que lo necesiten.
- *Evitar el uso de instrumentos viejos o en mal estado.
- *Evitar el uso de material contaminado o vencido.
- *Desechar los materiales utilizados lejos del área de trabajo en contenedores específicos diferenciados entre sí según el material descartado.

Aplicación

- *Revisar fechas de Vencimiento.
- *Para no afectar la calidad de la carne y del cuero, se recomienda vacunar en forma subcutánea en la región de la tabla del cuello o en la parte posterior de la paleta.



● Subcutánea

- *Homogeneizar previo al uso y durante el mismo, agitando periódicamente el frasco.
- *Leer cuidadosamente las instrucciones de uso y aplicarlas correctamente.

Esquema Sanitario Básico*



	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	
	Parición			Período de Vacunación Oficial de Brucelosis						Destete			
Cría	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Meses
	PROTECCIÓN POR CALOSTRO DE MADRES VACUNADAS			1° DOSIS CLOSTRIDIAL POLIVALENTE	2° DOSIS CLOSTRIDIAL POLIVALENTE			BRUCÉLICA					
Recría/Novillo	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Meses
		1° DOSIS VIRAL REPRODUCTIVA	2° DOSIS VIRAL REPRODUCTIVA					1° DOSIS LEPTOSPIROSIS				1° DOSIS DIARREA NEONATAL	2° DOSIS DIARREA NEONATAL
Vaquillona	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Meses
	1° DOSIS VIRAL REPRODUCTIVA	2° DOSIS VIRAL REPRODUCTIVA						1° DOSIS LEPTOSPIROSIS				1° DOSIS DIARREA NEONATAL	2° DOSIS DIARREA NEONATAL
Vaca/Toro	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	Meses
		1° DOSIS VIRAL REPRODUCTIVA						1° DOSIS LEPTOSPIROSIS				1° DOSIS DIARREA NEONATAL	
		CARBUNCLO						CLOSTRIDIAL POLIVALENTE				VIRAL FEEDLOT	
		CLOSTRIDIAL POLIVALENTE											

Servicio
 Tacto
 Parición
 Campañas Vacunación Aftosa

* Modificaciones sujetas a criterio del profesional veterinario